DAS POLLENBILD EUROPÄISCHER HEIDEHONIGE

(Le SPECTRE POLLINIQUE DES MIELS DE BRUYÈRE D'EUROPE)

A. MAURIZIO

Liebefeld, Schweiz

SOMMAIRE

L'auteur traite des possibilités de différenciation des miels de Callune européens par leur spectre pollinique. Les principaux types reconnus sont caractéristiques des régions suivantes :

1. Régions côtières du Nord et de la mer Baltique (partie ouest), 2. Régions côtières de la mer Baltique (partie est), 3. Scandinavie, 4. Îles Britanniques, 5. Régions côtières de l'Atlantique 6. Région des Alpes.

EINLEITUNG

Weite Gebiete Europas sind von einer als « Heide » (*Bruyère, heather*) bezeichneten Pflanzengesellschaft bedeckt. Die floristische Zusammensetzung variiert je nach der Lage und den lokalen Bedingungen. Gemeinsam ist der Heide in allen Gebieten das Vorherrschen des Heidekrautes (Besenheide, *bruyère commune, common heather, ling* — *Calluna vulgaris* (L.) HULL., Familie *Ericaceae*), was zur Bezeichnung « Callunetum » führte. In Mitteleuropa unterscheidet man vor allem zwei Heidetypen, die *Calluna*-Moorheide des Sphagnumtorfes und die *Calluna*-Heide der Trockenböden. Letztere lässt sich in die Niederungsheide (Sandheide) und die Bergheide gliedern. Zwischen diesen Haupttypen gibt es viele Uebergänge ; oft entsteht *Calluna*-Heide nach Abholzen von Wäldern. Die grösste Ausdehnung hat die europäische Heide in den atlantischen Gebieten mit ozeanischem Klima, von Nordspanien bis Schottland und Skandinavien ; verbreitet ist sie auch in den Küstengebieten der Nord- und Ostsee. In den Alpen liegt die obere Grenze der *Calluna*-Bestände zwischen 1400 (Bayerischer Wald) und 2700 m ü. M. (Graubünden, Tessin). *Calluna*-Heide mit mediterranem Einschlag findet sich am Südfuss der Alpen, in den Pyrenäen, den Seennen und im Apennin (HEGR).

Calluna vulgaris gehört, wie die Mehrzahl der Ericaceen zu den ausgiebigen Nektarspendern und wird durch zahlreiche Insekten (Honig- und Wildbienen, Hummeln, Fliegen, Falter usw.) befliegen. Die einzelnen *Calluna*-Blüten sondern, nach BOETIUS in 24 Stunden im Mittel 0,5 mg Nektar ab, mit einem mittleren Trockensubstanzgehalt von 24 p. 100, was einer täglichen Zuckerproduktion von 0,12–0,14 mg je Blüte entspricht. Berücksichtigt man die grosse Anzahl Blüten an einer *Calluna*-Pflanze und die Ausdehnung der Heidegebiete, so wird verständlich, dass in vielen Ländern West- und Nordeuropas die Heidetracht als eine der Haupttrachten des Jahres gilt und Bienenwanderung in die blühende Heide stattfindet.

Der Heidehonig besitzt gewisse physikalische und chemische Eigenschaften (Farbe, Geschmack, Aroma, Konsistenz, Eiweissgehalt usw.), die ihn von andern Honigsorten deutlich unterscheiden.

Die sulzige Konsistenz (Thixotropie) des Heidehonigs zwingt den Bienenzüchter die entdeckelten Waben vor dem Schleudern mit sog. Lösmaschinen zu behandeln, oder den Honig durch Pressen zu gewinnen. So ist der Sedimentgehalt des Heidehonigs weitgehend von der Gewinnungsart abhängig. Bei Heideschleuderhonigen bleibt er, mit 0,03–0,1 ml pro 100 g Honig meist im Rahmen der übrigen sorgfältig gewonnenen Honigsorten, wobei das System der verwendeten Lösmaschinen eine gewisse Rolle spielt. Heidepresshonige besitzen dagegen in der Regel einen erhöhten Sedimentgehalt, der über 0,2 ml in 100 g liegt (EVENIUS, 1933, 1958; LUNDER, 1955; ZANDER, 1932).

Das mikroskopische Bild des Heidehonigs zeigt ein charakteristisches Merkmal, das andern Ericaceenhonigen fehlt, das Auftreten eines von ZANDER als « feinkörnige Masse » bezeichneten Sediments, über dessen Natur nur wenig bekannt ist. Nach EVENIUS (1933) könnte es teilweise mit dem erhöhten Bakteriengehalt des Heidehonigs zusammenhängen. Ein ähnliches Sediment findet sich auch in einseitigen Edelkastanien und Bärenklauhonigen (Abb. 3, 4, 6).

Der absolute Pollengehalt bleibt bei Heideschleuderhonigen, mit 20 000 bis 100 000 in 10 g im Rahmen der übrigen Schleuderhonige. In Heidepresshonigen liegt er oft über 100 000 und kann Werte von 800 000 bis 900 000 in 10 g erreichen (MAURIZIO, 1949; PRITSCH 1958). In Zusammenhang mit der Handelsbezeichnung stellte sich die Frage nach der Abgrenzung von Heide-Sortenhonigen anhand des in ihrem Sediment nachgewiesenen Anteils von *Calluna*-Pollen (LOUVEAUX). In der Regel wird ein Honig als Sortenhonig bezeichnet, wenn er eine Pollenart als Leitpollen, mit einem Anteil von 45–50 p. 100 des Gesamtpollens enthält, und ausserdem die charakteristischen Merkmale der betreffenden Honigsorte besitzt. Ausnahmen von dieser Regel werden für extrem pollenarme oder pollenreiche Honigsorten gemacht, bei welchen angenommen werden muss, dass schon der Rohstoff verhältnismässig zu wenig, resp. zu viel Pollenkörner pro Einheit enthält. Das ist z.B. der Fall bei einseitigen Honigen von *Robinia*, *Salvia*, Lavandin, *Medicago*, *Tilia* und *Citrus*, deren absoluter Pollengehalt unter 20 000 bleibt, und bei einseitigen *Castanea*- und *Myosotis*-Honigen, die über 100 000, oft über 1 Million Pollenkörner in 10 g enthalten können. Um eine Vergleichsbasis zu andern Honigsorten zu schaffen, wird in diesen Fällen die Abgrenzung des Leitpollens unter 45 p. 100, resp. über 50 p. 100 angesetzt, oder Koeffizienten aufgestellt, mit welchen umgerechnet der wirkliche Anteil der betreffenden Pflanzenart am Honig eingeschätzt wird (DEMIANOWICZ. MAURIZIO, 1949; PRITSCH, 1958, dort weitere Literatur).

Da Heideschleuderhonige einen als « normal » anzuspreekenden Pollengehalt besitzen und nur Heidepresshonige pollenreicher sind, wäre im Prinzip die Abgrenzung des Heide-Sortenhonigs bei einem Leitpollenanteil von 45-50 % vorzunehmen. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass auch Honige mit einem *Calluna*-Begleitpollen (30-40 p. 100) oft die charakteristischen äusseren Merkmale des Heidehonigs (Farbe, Geschmack, Thixotropie) besitzen (Focke, Louveaux, Lunder, 1955). Nach Lunder sollten deshalb bei der Einschätzung des Heidehonigs gewisse Korrekturen vorgenommen werden.

Zur Frage der Kriterien für die Abgrenzung des Begriffes « Heidehonig » für den Honighandel nimmt Louveaux im vorliegenden Heft Stellung. Mein Beitrag befasst sich mit einem andern Problem, nämlich mit den Möglichkeiten einer mikroskopischen Unterscheidung von Heidehonigen verschiedener geographischer Herkunft. Es soll versucht werden, anhand des bisher vorliegenden Materials das Pollenbild von Heidehonigen aus verschiedenen Gegenden Europas zu charakterisieren, wobei vor allem Honige aus den Gebieten der Nord- und Ostsee, aus Skandinavien, den Britischen Inseln, dem atlantischen Küstengebiet und dem Alpenraum berücksichtigt werden. Eine Bearbeitung der französischen Heidehonige findet sich im vorliegenden Heft im Beitrag Génier.

EUROPÄISCHE HEIDEHONIG-TYPEN

Der Pollen von *Calluna vulgaris* besteht, wie die Mehrzahl der Ericaceenpollen aus Tetraden. Charakteristisch für *Calluna* ist, dass die vier Zelle der Tetrade häufig in einer Ebene gelagert sind (4-Zeller nach Zander, Abb. 1 a, b). Die Ausmasse der Tetraden sind gewissen Schwankungen unterworfen. Nach Zander (1936, 1937) ist *Calluna*-Pollen englischer und schottischer Herkunft deutlich kleiner, als solcher von deutschen Standorten (mittlere Masse der Tetraden in britischem Material : 3-Zeller 30,8:29,4 μ , 4-Zeller 39:33 μ ; in deutschem : 3-Zeller 34,6:30,2 μ , 4-Zeller 43:36,4 μ). Der französische *Calluna*-Pollen scheint nach Génier in der Grösse dem deutschen zu entsprechen (Mittelwert für 3-Zeller 35 μ). Unabgeklärt bleibt, ob diese Unterschiede für die bisher beschriebenen Varietäten und Formen von *Calluna vulgaris* charakteristisch sind.

Das Pollenbild des Heidehonigs kann, je nach der geographischen Herkunft gewisse charakteristische Eigenheiten aufweisen. Sie beruhen auf der Kombination des *Calluna*-Pollens mit den Begleitformen. Im folgenden werden die hauptsächlichsten bisher bekannten Typen europäischer Heidehonige beschrieben.

1. Heidehonige aus Holland

Die Heideimkerei spielt in Holland von alters her eine wichtige Rolle. De Boer fand in 35 p. 100 der untersuchten holländischen Honigproben (im ganzen 268 Proben) *Calluna*-Pollen in wechselnden Mengen. Zwanzig Proben enthielten *Calluna* als Leitpollen. In zehn weiteren, von mir untersuchten, als Heidehonig deklarierten holländischen Proben fand sich *Calluna* als Leit- oder Begleitpollen, mit einem Anteil von

49-71 p. 100, resp. 29-40 p. 100. Unter den Begleitpflanzen steht *Trifolium repens*, zum Teil als Leitpollen an erster Stelle. Als weitere charakteristische Begleitformen holländischer Heidehonige sind zu nennen: *Centaurea cyanus*, *Fagopyrum sagittatum*, *Erica tetralix*, *Rhamnus*, *Vicia faba*, und seltener Cruciferen, *Rubus*, *Epilobium*, *Filipendula ulmaria* und *Lotus uliginosus*. Öfters fand sich auch Pollen von *Hedera helix*, der in einer der Proben mit 42 p. 100 eine dominierende Stellung einnahm (Abb. 1 a).

2. Heidehonige aus Deutschland

Nach bisherigen Veröffentlichungen wird Heidehonig in Deutschland vor allem in den grossen norddeutschen Heidegebieten (Niedersachsen, Weser-Ems, Westfalen usw.) geerntet, wo regelmässig Wanderung in die Heidetracht stattfindet (z.B. Lüneburger Heide). Seltener ist Heidehonig in Süddeutschland (Rheinpfalz, Bayern, EVENIUS, 1932, 1960; FOCKE, PRITSCH, ZANDER, 1935, 1937, eigene Untersuchungen). Von den 22 näher untersuchten, als Heidehonig bezeichneten Proben stammten 19 aus Norddeutschland. Fünfzehn davon enthielten *Calluna* auf der Stufe des Leitpollens (66-95 p. 100), die übrigen als Begleitpollen (17-36 p. 100). Unter den Begleitformen treten Leguminosen mengenmässig hervor, darunter vor allem *Trifolium repens* und *Lotus uliginosus* (Abb. 1 b). Der Pollen von *Lotus uliginosus* scheint für norddeutsche Heidehonige besonders charakteristisch zu sein. Er fand sich in fast allen untersuchten Proben und trat oft auf der Stufe des Begleitpollens (33-34 p. 100), einmal sogar als Leitpollen (62 p. 100) auf. Weitere häufige Begleitformen sind: *Vaccinium vitis idaea* (bis zu 18 p. 100), *Centaurea cyanus*, *Rhamnus*, Cruciferen, *Tilia*, *Epilobium*, *Melilotus*, *Erica tetralix* und *Parthenocissus*.

Ein abweichendes Pollenbild zeigen, nach ZANDER (1937) die süddeutschen Heidehonige, die neben *Calluna* vor allem *Trifolium*-Arten, *Heracleum* und Cruciferen führen. Eine Probe aus der Rheinpfalz verrät ihre Herkunft durch *Castanea*-Pollenkörner.

3. Heidehonige aus Dänemark

Die dänischen Honige gehören zu den mikroskopisch am besten bearbeiteten in Europa. HAMMER et al. veröffentlichten die Analysen von 556 dänischen Honigen; 51 weitere Proben wurden von MAURIZIO (1943) untersucht. HAMMER (1949) und WOLTERS (1955, 1956) befassten sich besonders mit der Heidetracht und dem Heidehonig in verschiedenen Teilen Dänemarks. Danach sind weite Gebiete, vor allem in Jütland von Heide bedeckt und ein Drittel bis ein Viertel aller dänischen, sowie zwei Drittel bis die Hälfte aller jütländischen Honige stammen aus Heidetracht. Die dänischen Heidehonige führen *Calluna* in der Regel als Leitpollen, wobei der Anteil bis zu 99 p. 100 betragen kann.

Wie alle dänischen Honige enthalten auch die Heidehonige stets grössere Mengen *Trifolium repens*-Pollen, der oft als Begleitpollen, manchmal sogar als Leitpollen auftritt. Als weiteres charakteristisches Merkmal dänischer Heidehonige kann der hohe Anteil von Cruciferenpollen, und das regelmässige Auftreten von *Jasione montana*, *Centaurea cyanus* und *Filipendula ulmaria* angesprochen werden. *Erica tetralix* findet sich darin häufig, bleibt aber meist auf der Stufe des Einzelpollens. WOLTERS fand unter den 281 untersuchten dänischen Heidehonigen, drei mit einem höheren Anteil

von *Erica tetralix* (6-22 p. 100). Diese drei Proben unterschieden sich in Farbe und Konsistenz (Fehlen der Thixotropie) von den *Calluna*-Honigen und können als *Erica*-Honige bezeichnet werden.

4. Heidehonige aus Polen und Litauen

Ueber das mikroskopische Bild von Heidehonigen aus Polen und Litauen ist bisher nur wenig bekannt. Die Beobachtungen stützen sich auf die Mitteilung von SERWATKA und unveröffentlichte Analysen von FOCKE und MAURIZIO. Danach enthalten nordpolnische und litauische Heidehonige neben *Calluna* (als Leit- oder Begleitpollen), vor allem Pollenkörner von Cruciferen, *Fagopyrum* und *Trifolium repens*, sowie von *Centaurea cyanus*, *Jasione montana*, *Vaccinium*, *Epilobium* und Labiaten L., M., und S. (Abb. 2).

5. Heidehonige aus Schweden, Norwegen und Finnland

Besser bekannt ist das Pollenbild schwedischer, norwegischer und finnischer Heidehonige (FORSIUS, LUNDER, 1945, 1955; MARTIMO, MAURIZIO, 1964, und unveröffentlichtes Material, ZANDER, 1937).

Im Pollenbild der 173 von LUNDER (1945) untersuchten schwedischen Honigproben herrscht *Trifolium repens* (*Trifolium hybridum* inbegriffen) mengenmässig vor; an zweiter Stelle steht *Calluna vulgaris*, als Leit- oder Begleitpollen (bis zu 86 p. 100). Als Begleitformen nennt LUNDER vor allem *Vaccinium vitis idaea* (zum Teil als Begleitpollen), *Centaurea cyanus* und *Epilobium*, seltener sind *Trifolium pratense*, *Salix* und *Rubus*.

Etwas abweichend ist das Pollenspektrum der bisher untersuchten norwegischen Heidehonige. Der *Calluna*-Anteil liegt hier oft sehr hoch (über 70 p. 100, nach ZANDER bis 100 p. 100) und ist nach LUNDER (1955) abhängig vom System der Lösapparate. Neben *Calluna* finden sich in norwegischen Honigen vor allem Pollenkörner von *Trifolium repens*, *Erica tetralix*, *Rubus*, *Filipendula* und *Centaurea j.* (nach FAEGRI, *Centaurea nigra*). Das Verhältnis zwischen *Calluna* und *Erica tetralix* kann sich manchmal so weit verschieben, dass eigentliche *Erica*-Honige entstehen (*Erica tetralix* bis 43 p. 100), die sich durch Farbe und das Fehlen der Thixotropie von den Heidehonigen unterscheiden. Zu erwähnen ist, dass auch zwei von mir untersuchte Hummelhonige aus Norwegen *Erica tetralix* als Leit- bzw. Begleitpollen enthielten (neben *Calluna*, *Trifolium repens*, *Rubus* und *Filipendula*, MAURIZIO, 1964, Abb. 3 a).

Die ersten Pollenanalysen finnischer Honige wurden von MARTIMO ausgeführt. Neuerdings hat A. FORSIUS diese Untersuchungen ausgebaut und auf das ganze Land ausgedehnt. Danach wird in Finnland, trotz grosser Heideflächen, Heidehonig hauptsächlich im Süden und Südwesten des Landes geerntet, und auch dort nur in besonders günstigen Jahren. Unter den bisher untersuchten, mehr als 200 Honigproben fand sich eine mit *Calluna*-Leitpollen (MARTIMO) und vier weitere mit *Calluna*-Begleitpollen (23-35 p. 100, FORSIUS). In den übrigen Proben blieb *Calluna* auf der Stufe des Einzelpollens (1-11 p. 100). Vorherrschend ist in finnischen, ähnlich wie in den übrigen skandinavischen Honigen, Pollen von *Trifolium repens* (sehr oft als Leitpollen mit 48-73 p. 100). Als häufige Begleitformen werden von FORSIUS und MARTIMO genannt: *Vaccinium*, *Salix*, *Filipendula*, Compositen (darunter *Centaurea*

cyanus) und *Trifolium pratense*, seltener sind Cruciferen, Umbelliferen, *Ribes* und *Epilobium*.

6. Heidehonige aus Grossbritannien und Irland

Resultate pollenanalytischer Untersuchungen von Heidehonigen aus Grossbritannien und Irland sind vor allem von DEANS (1939, 1957) veröffentlicht worden; eine Analyse wird von ZANDER (1937) angeführt, eine Anzahl englischer und schottischer Honige wurde von mir untersucht. Danach liegt das Haupttrachtgebiet von Heidehonig in Schottland; in England wird er in Devon, Lancashire, Sommerset, Worcester, Cheshire und Yorkshire geerntet, häufig ist er auch in Wales.

In schottischen Honigen herrscht *Calluna* oft als Leitpollen vor (mit 50-90 p. 100). An zweiter Stelle steht *Trifolium repens*, das sehr häufig als Begleitpollen, gelegentlich als Leitpollen auftritt. Als wichtige Begleitform ist *Erica cinerea* zu nennen, die für viele Honige aus dem atlantischen Bereich charakteristisch ist, im Gebiet der Nord- und Ostsee aber fehlt. In der Regel bleibt *Erica cinerea* auf der Stufe des Einzelpollens, gelegentlich kann sie als Begleit- oder Leitpollen auftreten, so dass eigentliche *Erica*-Honige vorliegen, die in Farbe, Geschmack und Konsistenz (Fehlen der Thixotropie) deutlich verschieden sind von *Calluna*-Honigen. Weitere Begleitformen schottischer Heidehonige sind: *Epilobium*, *Rubus*, *Lotus* und Cruciferen (Abb. 3 b).

Mannigfaltiger ist das Pollenbild von Heidehonigen aus England, Wales und Irland. Hauptpollenformen sind zwar auch hier *Calluna* und *Trifolium repens*, häufig begleitet von *Erica cinerea*. Daneben aber findet sich Pollen von *Trifolium pratense*, Cruciferen, *Filipendula*, *Rubus*, *Acer*, *Tilia*, *Vicia* und *Castanea sativa*.

So lassen sich Heidehonige aus Grossbritannien nicht nur mit einiger Sicherheit von den nordeuropäischen unterscheiden, sondern es bestehen in Grossbritannien selbst zwei unterschiedliche Heidehonigtypen.

7. Heidehonige aus den atlantischen Gebieten Westeuropas

Die im atlantischen Küstengebiet geernteten Heidehonige gehören zu den eigenartigsten europäischen Honigtypen. Die Verbreitung der Ericaceen in Frankreich und ihre Bedeutung für die französische Honigtracht werden im vorliegenden Heft eingehend von GÉNIER behandelt. Hier sollen sie nur im gesamteuropäischen Rahmen berücksichtigt werden.

Die Heidehonige der atlantischen Küstengebiete Frankreichs sind charakterisiert durch die Pollenkombination *Calluna-Erica cinerea* (und andere Ericaceen z.B. *Erica vagans*)-*Castanea-Jasione*-Leguminosen, oft begleitet von *Hedera*, *Rubus*, Labiaten M., *Rhamnus*, und in der Bretagne von *Fagopyrum sagittatum*. Dieses Pollenspektrum ist so eigenartig, dass z.B. Heidehonige aus den Landes mit keinem andern europäischen Heidehonig verwechselt werden können (Abb. 4).

Der *Castanea*-Anteil erreicht in diesen Honigen häufig die Stufe des Begleitpollens, manchmal steigt er über 50 p. 100, ohne dass dadurch die äusseren Merkmale des Heidehonigs wesentlich beeinflusst würden (vergl. LOUVEAUX dieses Heft). Abweichende äussere Merkmale zeigen dagegen Honige, in welchen *Calluna* mengenmässig durch *Erica cinerea* verdrängt wird.

Der atlantische Typus des Heidehonigs bleibt nicht auf die Westküste Fran-

kreichs beschränkt, sondern findet sich auch in Nordwest-Spanien und in Portugal. Hier ändert sich jedoch des Pollenbild, indem neben *Calluna*, *Erica cinerea*, *Erica vagans*, *Castanea* und *Rubus*, mediterrane Formen auftauchen wie *Erica arborea*, *Erica umbellata*, *Erica ciliaris*, *Erica australis*, *Cistus*-Arten, *Rosmarinus*, *Lavandula*, *Olea*, *Echium plantagincum* und *Eucalyptus*. Oft steigt der Anteil der *Erica*-Arten (vor allem *Erica cinerea*, *E. arborea* und *E. umbellata*) bis zur Stufe des Leitpollens, wobei *Calluna* nur noch als Begleitform auftritt und die äusseren Merkmale des Heidehonigs verschwinden. Durch diesen mediterranen Einschlag unterscheiden sich die nordwestspanischen und portugiesischen Heidehonige von den westfranzösischen und führen zu den südspanischen und südfranzösischen Ericaceen-Honigen über (ALTE, GÉNIER, LOUVEAUX und VERGERON, VIETZ, 1950, 1951, eigene Untersuchungen).

8. Heidehonige aus dem Alpengebiet

Honige mit einem bis zur Stufe des Begleit- oder Leitpollens ansteigenden Anteil *Calluna*-Pollen werden gelegentlich im Gebiete der Alpen geerntet (bisher in der Schweiz und der Steiermark festgestellt, FOSSEL, MAURIZIO unveröffentlicht).

In der Schweiz findet sich *Calluna*-Pollen regelmässig in Honigen aus dem Kanton Tessin und den Südtälern Graubündens, seltener tritt er in Honigen aus den Bergtälern der Alpennordseite auf. Der *Calluna*-Anteil bleibt meist auf der Stufe des Einzelpollens (unter 15 p. 100). In gewissen Jahren, wenn heisse und trockene Witterung die Heidebestände frühzeitig zur Blüte bringt, entstehen Honige mit höherem *Calluna*-Anteil (19-34 p. 100), manchmal sogar mit einem *Calluna*-Leitpollen (bis 70 p. 100), die alle äusseren Merkmale des Heidehonigs besitzen (bisher festgestellt in 52 Proben). Das Pollenbild dieser Honige ist völlig verschieden von dem anderer europäischer Heidehonige.

In Honigen aus dem mittleren Tessin findet sich *Calluna* als Einzel- oder Begleitpollen, neben *Castanea sativa* (50-90 p. 100), *Rubus*, *Robinia*, *Tilia*, *Trifolium repens*, *Heracleum*, *Centaurea jacea* und *Luzula* (Abb. 5 a). In den Honigen aus den Tessiner- und Bündner-Südtälern tritt *Castanea* mengenmässig zurück und wird durch Bergformen ersetzt, wie *Rhododendron*, *Myosotis alpestris*, *Campanula*, *Helianthemum*, *Lotus corniculatus*, *Hippocrepis comosa* und Labiaten M. Der Tessiner-Niederungshonig kann demnach als Edelkastanienhonig mit Heideeinschlag bezeichnet werden, die Ernten aus den Alpensüdtälern als Berg-Edelkastanien-Heidehonig (Abb. 5 b).

Anders ist das Pollenbild der Heidehonige, die in besonders günstigen Jahren in den Bergtälern der Alpennordseite geerntet werden (z.B. im Unterengadin, dem oberen Reusstal, dem oberen Rheintal und seinen Seitentälern, in Obwalden, dem Entlebuch und dem Berner Oberland). Hier fehlt *Castanea*-Pollen völlig; *Calluna* tritt als Leit- oder Begleitform ausgesprochener Berghonige auf, in Kombination mit: Leguminosen (*Trifolium repens*, *Tr. pratense*, *Onobrychis viciifolia*, *Lotus corniculatus*, *Hippocrepis comosa*), *Rhododendron*, *Myosotis alpestris*, *Campanula*, *Helianthemum*, *Rubus*, *Polygonum bistorta*, *Salix*, Labiaten M., *Acer pseudoplatanus*, *Epilobium angustifolium* und *Heracleum sphondylium* (Abb. 6 a). Ein auffälliges Pollenbild zeigte eine Honigprobe aus dem Entlebuch, die *Heracleum sphondylium* als Leitpollen (67 p. 100), *Calluna vulgaris* als Begleitpollen 19 p. 100 und Einzelkörner von *Trifolium repens*, *Lotus*, *Helianthemum* und *Centaurea jacea* führte (Abb. 6 b). Die

Honige aus den Alpen-Nordtälern können als Berg-Heidehonige bezeichnet werden. In der Regel handelt es sich um Blütenhonige ohne nennenswerten Honigtauanteil. Nur in einer Probe (aus dem oberen Reusstal) fand sich neben 17 p. 100 *Calluna*-Pollen ein beträchtlicher Anteil von Honigtaubestandteilen (18 p. 100 Algenzellen und 163 Pilzsporen). Interessant ist, dass der prozentuale *Calluna*-Anteil, wie in Niederungs-Heidehonigen, in der schleuderbaren Fraktion deutlich niedriger ist (19-24 p. 100), als in dem nach dem Schleudern in den Wabenzellen verbleibenden Teil (34-70 p. 100). Bei Ueberwinterung auf solchen mit schwerschleuderbarem Heidehonig gefüllten Waben, traten zum Teil schwere Schädigungen der Völker auf.

In der Steiermark ist, nach FOSSEL, der in der Schweiz bisher nur einmal beobachtete Typus eines Berg-Waldhonigs mit vermehrtem *Calluna*-Anteil häufig. *Calluna*-Pollen tritt darin als Einzel- oder Begleitpollen (bis 32 p. 100.) auf, in Begleitung von *Trifolium repens*, *Rubus*, *Rhododendron*, Cruciferen, *Filipendula*, *Acer*, *Hypericum* und Honigtaubestandteilen. Aeusserlich besitzt dieser Honig alle Merkmale des Heidehonigs.

Reçu pour publication en octobre 1966.

VERDANKUNG

Allen, die mir bei der Abfassung der vorliegenden Mitteilung durch Ueberlassung von Honigmaterial behilflich waren, möchte ich hier den besten Dank aussprechen. Mein besonderer Dank gilt Frau A. FORSIUS (Helsinki), Frä. E. FÖCKE und den Herren Dr. J. EVENIUS und Dr. W. KAESER (Celle) für die Erlaubnis, noch nicht publizierte Pollenanalysen finnischer und norddeutscher Heidehonige zu verwenden.

Abb. 1. — Heidehonig aus Holland und Norddeutschland.

- a) Holländischer Honig, Pollen : *Calluna vulgaris*, *Trifolium repens*, *Vicia faba*.
 b) Norddeutscher Honig, Pollen : *Calluna vulgaris*, *Lotus uliginosus*, *Trifolium repens*.

Vergrosserung 400 fach.

Photo : H. Kollmann, J. Hättenschwiler.

Abb. 2. — Poinischer Heidehonig, Pollen : *Calluna vulgaris*, Cruciferen, *Fagopyrum sagittatum*, *Trifolium repens*.

Vergrosserung 400 fach.

Photo : J. Hättenschwiler.

Abb. 3. — Heidehonige aus Skandinavien und Schottland.

a) Norwegischer Honig, Pollen : *Erica tetralix*, *Rubus*, *Salix*.

b) Schottischer Honig, Pollen : *Calluna vulgaris*, *Trifolium repens*, *Erica cinerea*, *Epilobium angustifolium*.

Vergrößerung 400 fach.

Photo : H. Kollmann.

Abb. 4. — Heidehonige aus den atlantischen Küstengebiet Frankreichs, Pollen : *Calluna vulgaris*, *Erica cinerea*, *Jasione montana*, *Castanea sativa*.

Vergrößerung 400 fach.

Photo : H. Kollmann, J. Hättenschwiler.

Abb. 5. — Heidehonige aus dem Alpengebiet (Südhang).

- a) Tessiner — Niederungshonig, Pollen : *Castanea sativa*, *Calluna vulgaris*, *Robinia pseudacacia*, *Trifolium repens*, *Rhamnus*.
 b) Tessiner — Berghonig, Pollen : *Castanea Sativa*, *Rhododendron*, *Calluna vulgaris*, *Campanula*.

Vergrößerung 400 fach.

Photo : J. Hättenschwiler.

Abb. 6. — Heidehonige aus dem Alpengebiet (Nordhang).

- a) Berghonig aus Graubünden, Pollen : *Myosotis alpestris*, *Calluna vulgaris*, *Rhododendron*, Labiaten M.
 b) Honig aus dem Entlebuch, Pollen : *Calluna vulgaris*, *Heracleum sphondylium*.

Vergrößerung 400 fach.

Photo : J. Hättenschwiler.

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den Möglichkeiten einer Unterscheidung europäischer Heidehonige verschiedener geographischer Herkunft, anhand des Pollenspektrums. Unter dem Einfluss der Klimabedingungen und der floristischen Zusammensetzung der Heidebestände, entstehen in den einzelnen Heidegebieten Honige verschiedener Prägung. Gemeinsam ist allen Heidehonigen das Vorherrschen von *Calluna vulgaris* (L.) HULL. im Pollenbild und die mit der Heidetraucht verbundenen äusseren Merkmale (Farbe, Geschmack, Aroma, Thixotropie, Eiweissgehalt). Je nach den lokalen Verhältnissen variiert das Zusammenspiel der Begleitformen, was zur Bildung mehrerer, mikroskopisch unterscheidbarer Heidehonigtypen führt. Die hauptsächlichsten Typen europäischer Heidehonige und ihre Verbreitung, lassen sich wie folgt charakterisieren :

a. *Küstengebiete der Nord und Ostsee*
(westlicher Teil, Holland, Deutschland, Dänemark)

Im Pollenbild herrschen *Calluna vulgaris* und *Trifolium repens* vor, kombiniert mit : *Vaccinium vitis idaea*, *Erica tetralix*, *Lotus uliginosus* (Norddeutschland, Dänemark), Cruciferen, *Jasione*, *Filipendula* (Dänemark) und *Hedera* (Holland).

b. *Küstengebiete der Ostsee*
(östlicher Teil, Polen, Litauen)

Das Pollenbild ist gekennzeichnet durch das Vorherrschen von *Calluna vulgaris* und Cruciferen, in Kombination mit : *Trifolium repens*, *Centaurea cyanus*, *Fagopyrum sagittatum* und *Vaccinium*.

c. *Skandinavien*
(Schweden, Norwegen, Finnland)

Vorherrschend sind hier, wie im Typus a. *Calluna vulgaris* und *Trifolium repens*, in Verbindung mit : *Vaccinium*-Arten, *Erica tetralix*, *Rubus*, *Salix*, *Epilobium angustifolium*, *Trifolium pratense*, *Filipendula*, *Centaurea cyanus* (Schweden, Finnland) und *Centaurea nigra* (Norwegen).

d. *Britische Inseln*
(Schottland, England, Wales, Irland)

Charakteristisch für das ganze Gebiet ist die Verbindung *Calluna vulgaris*, *Trifolium repens*, *Erica cinerea*. Innerhalb dieses Typus lassen sich zwei Nuancen unterscheiden, eine formenarme (Schottland) mit : *Calluna*, *Trifolium repens*, *Erica cinerea*, *Epilobium*, *Rubus*, *Lotus*, Cruciferen, und eine formenreichere (England, Wales, Irland) mit : *Calluna*, *Trifolium repens*, *Erica cinerea*, Cruciferen, *Filipendula*, *Trifolium pratense*, *Rubus*, *Castanea*, *Tilia*, *Acer*, *Vicia* usw.

e. *Atlantische Küstengebiete*
(Frankreich, Spanien, Portugal)

Für das ganze Gebiet ist die Verbindung *Calluna vulgaris*, *Erica*-Arten (*Erica cinerea*, *E. vagans*), *Castanea* kennzeichnend. Innerhalb dieses Typus sind zwei Nuancen zu unterscheiden, eine nördliche (Frankreich) und eine südliche (Nordspanien, Portugal). Die Heidehonige aus dem französischen Atlantik-Küstengebiet sind charakterisiert durch die Pollenverbindung : *Calluna*, *Erica cinerea*, *Erica vagans*, *Castanea*, *Jasione*, Leguminosen, oft begleitet von *Rubus*, *Hedera*, Labiaten *M.*, *Rhamnus* und *Fagopyrum* (Bretagne). Der südliche Typus (Nordspanien, Portugal) enthält neben *Calluna*, *Erica cinerea*, *Erica vagans* und *Castanea*, eine mediterrane Komponente mit weiteren *Erica*-Arten (*Erica arborea*, *E. umbellata*, *E. ciliaris*, *E. australis*), *Rosmarinus*, *Lavandula*, *Olea*, *Echium* (*plantagineum*) und *Eucalyptus*. Dieser Typus bildet den Uebergang zu den mediterranen Ericaceen-Honigen, in welchen *Calluna* fehlt.

f. *Alpengebiet (Schweiz, Österreich) und Süddeuschland*

Süddeutsche Heidehonige zeigen die Pollenkombination : *Calluna vulgaris*, *Trifolium*-Arten, *Heracleum*, Cruciferen, manchmal begleitet von *Castanea* (Rheinpfalz). Im Alpengebiet lassen sich zwei verschiedene Honigtypen unterscheiden, mit mehr oder weniger starker Beteiligung von *Calluna*. Im südlichen (Tessin, Alpensüdtäler) tritt *Calluna* meist als Einzel-oder Begleitpollen auf, neben *Castanea* (Leitpollen), kombiniert mit *Rubus*, *Robinia*, *Tilia*, *Trifolium repens*, *Heracleum*, *Centaurea jacea* und *Luzula*. In den Südtälern gesellen sich Bergformen dazu (*Rhododendron*, *Myosotis alpestris*, *Campanula*, *Helianthemum*, *Lotus corniculatus*, *Hippocrepis comosa*, Labiaten *M.* usw.). Der nördliche Typus (Bergtäler der Alpennordseite) führt *Calluna vulgaris* in Verbindung mit einem ausgesprochenen Bergformen-Spektrum (*Rhododendron*, *Myosotis alpestris*, *Campanula*, *Helianthemum*, *Polygonum bistorta*, *Salix*, *Heracleum*, *Epilobium angustifolium*, *Acer pseudoplatanus*), manchmal kombiniert mit Honigtaubestandteilen. Eine besondere Abart des Berg-Heidehonigs findet sich in der Steiermark, mit der Pollenkombination : *Calluna*, *Trifolium repens*, *Rubus*, *Rhododendron*, Cruciferen, *Filipendula*, *Acer*, *Hypericum* und starkem Honigtau-Anteil.

RÉSUMÉ

Le présent travail traite des possibilités de différenciation des miels de bruyère européens à l'aide du spectre pollinique. Sous l'influence des conditions climatiques et de la composition florale des étendues végétales, l'on récolte dans les diverses régions de bruyère des miels de caractère différent. Tous les miels de bruyère ont en commun *Calluna vulgaris* (L.) HULL, comme pollen dominant, et d'autres signes extérieurs liés à la miellée de bruyère (couleur, goût, arôme, thixotropie, teneur en protéine). La composition des espèces d'accompagnement varie suivant les conditions locales, ce qui détermine la formation de plusieurs types de miel de bruyère dont les différences sont discernables au microscope. Les principaux types de miel de bruyère européens et leur répartition peuvent se différencier de la façon suivante :

a) *Régions côtières de la mer du Nord et de la mer Baltique*
(Partie Ouest, Hollande, Allemagne, Danemark)

Calluna vulgaris, et *Trifolium repens* dominant dans le spectre pollinique, accompagnés de *Vaccinium vitis idaea*, *Erica tetralix*, *Lotus uliginosus* (Allemagne du Nord, Danemark), Crucifères, *Jasione*, *Filipendula* (Danemark) et *Hedera* (Hollande).

b) *Régions côtières de la mer Baltique*
(Partie Est, Pologne, Lithuanie)

Le spectre pollinique est caractérisé par la dominance de *Calluna vulgaris* et de Crucifères, accompagnés de *Trifolium repens*, *Centaurea cyanus*, *Fagopyrum sagittatum* et *Vaccinium*.

c) *Scandinavie*
(Suède, Norvège, Finlande)

Les pollens dominants sont ici comme dans le type a : *Calluna vulgaris* et *Trifolium repens*, accompagnés de *Vaccinium*, *Erica tetralix*, *Rubus*, *Salix*, *Epilobium angustifolium*, *Trifolium pratense*, *Filipendula*, *Centaurea cyanus* (Suède, Finlande) et *Centaurea nigra* (Norvège).

d) *Iles Britanniques*
(Écosse, Angleterre, Pays de Galles, Irlande)

Toute cette région se caractérise par l'association *Calluna vulgaris*, *Trifolium repens*, *Erica cinerea*. A l'intérieur de ce type on peut distinguer 2 groupes, l'un qui est pauvre en espèces (Écosse) avec *Calluna*, *Trifolium repens*, *Erica cinerea*, *Epilobium*, *Rubus*, *Lotus*, Crucifères, et un autre plus riche en espèces (Angleterre, Pays de Galles, Irlande) avec *Calluna*, *Trifolium repens*, *Erica cinerea*, Crucifères, *Filipendula*, *Trifolium pratense*, *Rubus*, *Castanea*, *Tilia*, *Acer*, *Vicia*, etc.

e) *Régions côtières de l'Atlantique*
(France, Espagne, Portugal)

Dans toutes ces régions on trouve l'association *Calluna vulgaris*, *Erica* et ses espèces (*Erica cinerea*, *E. vagans*), *Castanea*. A l'intérieur de ce type on peut distinguer un groupe nord (France) et un groupe sud (Espagne du Nord, Portugal). Les miels de bruyère provenant des côtes françaises atlantiques se caractérisent par l'association : *Calluna*, *Erica cinerea*, *Erica vagans*, *Castanea*, *Jasione*, Légumineuses accompagnés souvent de *Rubus*, *Hedera*, Labiées *M.*, *Rhamnus* et *Fagopyrum* (Bretagne). Le type sud (Espagne du Nord, Portugal) renferme à côté de *Calluna*, *Erica cinerea*, *Erica vagans* et *Castanea*, une composante méditerranéenne avec des espèces d'*Erica* (*Erica arborea*, *E. umbellata*, *E. ciliaris*, *E. australis*), *Rosmarinus*, *Lavandula*, *Olea*, *Echium* (*plantagineum*) et *Eucalyptus*. Ce type constitue une transition vers les miels méditerranéens d'Ericacées, dans lesquels n'apparaît pas *Calluna*.

f) *Région des Alpes* (Suisse, Autriche) et *Allemagne du Sud*

En Allemagne du Sud les miels de bruyère présentent la composition pollinique suivante : *Calluna vulgaris*, *Trifolium*, *Heracleum*, Crucifères, parfois accompagnés de *Castanea* (Palatinat). Dans les Alpes on distingue 2 types différents de miel avec une participation plus ou moins importante de *Calluna*. Dans le Sud (Tessin, vallées méridionales des Alpes) *Calluna* apparaît surtout comme pollen isolé ou pollen d'accompagnement avec *Castanea* (pollen dominant) en combinaison avec *Rubus*, *Robinia*, *Tilia*, *Trifolium repens*, *Heracleum*, *Centaurea jacea* et *Luzula*. Dans les vallées méridionales viennent s'ajouter des espèces montagnardes (*Rhododendron*, *Myosotis alpestris*, *Campanula*, *Helianthemum*, *Lotus corniculatus*, *Hippocrepis comosa*, Labiées *M.* etc.). Le type nord (vallées du versant nord des Alpes) contient *Calluna vulgaris* combiné avec un spectre très net d'espèces montagnardes (*Rhododendron*, *Myosotis alpestris*, *Campanula*, *Helianthemum*, *Polygonum bistorta*, *Salix*, *Heracleum*, *Epilobium angustifolium*, *Acer pseudoplatanus*), parfois associés à du meillat. On trouve en Styrie une variété de miel des montagnes avec l'association pollinique suivante : *Calluna*, *Trifolium repens*, *Rubus*, *Rhododendron*, Crucifères, *Filipendula*, *Acer*, *Hypericum* et une proportion importante de meillat.

SUMMARY

THE POLLEN SPECTRUM OF HEATHER HONEYS IN EUROPE

The present paper concerns the possibility of differentiating European heather honeys by their pollen spectrum. Under the influence of climatic conditions and the floral composition of the plant communities, honeys of differing characteristics are found in the various heather regions. All the heather honeys have *Calluna vulgaris* (L.) Hull as dominant pollen, and share other external signs associated with heather honey-flow (colour, taste, aroma, thixotropy, protein content). The composition of the accompanying species varies with local conditions. This determines the formation of several types of heather honey, whose differences can be distinguished under the microscope. The main types of European heather honey and their distribution can be differentiated as follows :

a) *Coastal regions of the North Sea and the Baltic Sea* (Western part Netherlands, Germany, Denmark).

Calluna vulgaris and *Trifolium repens* are dominant in the pollen spectrum accompanied by *Vaccinium vitis idaea*, *Erica tetralix*, *Lotus uliginosus* (North Germany, Denmark), Cruciferae, *Jasione*, *Filipendula* (Denmark) and *Hedera* (Netherlands).

b) *Coastal regions of the Baltic Sea* (Eastern part, Poland, Lithuania).

The pollen spectrum is distinguished by the dominance of *Calluna vulgaris* and Cruciferae, accompanied by *Trifolium repens*, *Centaurea cyanus*, *Fagopyrum sagittatum* and *Vaccinium*.

c) *Scandinavia* (Norway, Sweden, Finland).

The dominant pollens are here, as in type a) *Calluna vulgaris* and *Trifolium repens*, accompanied by *Vaccinium*, *Erica tetralix*, *Rubus*, *Salix*, *Epilobium angustifolium*, *Trifolium pratense*, *Filipendula*, *Centaurea cyanus* (Sweden, Finland) and *Centaurea nigra* (Norway).

d) *The British Isles* (Scotland, England, Wales, Ireland).

This region is distinguished by the association *Calluna vulgaris*, *Trifolium repens*, *Erica cinerea*. Within this type, two groups, one with few species (Scotland) — *Calluna*, *Trifolium repens*, *Erica cinerea*, *Epilobium*, *Rubus*, *Lotus* and Cruciferae, and the other with more species (England, Ireland, Wales) — *Calluna*, *Trifolium repens*, *Erica cinerea*, Cruciferae, *Filipendula*, *Trifolium pratense*, *Rubus*, *Castanea*, *Tilia*, *Acer*, *Vicia* etc. can be distinguished.

e) *Coastal regions of the Atlantic* (France, Spain, Portugal).

In all these regions the association *Calluna vulgaris*, *Erica* (*Erica cinerea*, *E. vagans*) and *Castanea* is found. Within this type a northern group (France) and a southern group (Northern Spain, Portugal) can be distinguished. The heather honeys from the Atlantic coasts of France can be distinguished by the association *Calluna*, *Erica cinerea*, *Erica vagans*, *Castanea*, *Jasione*, Leguminosae, often accompanied by *Rubus*, *Hedera*, Labiatae M., *Rhamnus* and *Fagopyrum* (Britany). The southern type (Northern Spain, Portugal) includes, besides *Calluna*, *Erica cinerea*, *Erica vagans*, and *Castanea*, a Mediterranean constituent, species of *Erica* (*Erica arborea*, *E. umbellata*, *E. ciliaris*, *E. australis*), *Rosmarinus*, *Lavandula*, *Olea*, *Echium* (*plantagineum*) and *Eucalyptus*. This type forms a transition towards the Mediterranean honeys of the Ericaceae, in which no *Calluna* appears.

f) *Alpine region* (Switzerland, Austria) and *South Germany*.

In South Germany, the heather honeys are of the following pollen composition: *Calluna vulgaris*, *Trifolium*, *Heracleum*, Cruciferae, sometimes accompanied by *Castanea* (Rhine-Palatinate). In the Alps, two different types of honey can be distinguished, *Calluna* being of varying importance. In the South (Tessin, southern valleys of the Alps) *Calluna* appears chiefly as isolated or accompanying pollen with *Castanea* (dominant pollen), in combination with *Rubus*, *Robinia*, *Tilia*, *Trifolium repens*, *Heracleum*, *Centaurea jacea* and *Luzula*. In the southern valleys mountain species are added (*Rhododendron*, *Myosotis alpestris*, *Campanula*, *Helianthemum*, *Lotus corniculatus*, *Hippocrepis comosa*, Labiatae M. etc.). The northern type (northern mountain valleys of the Alps) contains *Calluna vulgaris* combined with a very pronounced spectrum of mountain species (*Rhododendron*, *Myosotis alpestris*, *Campanula*, *Helianthemum*, *Polygonum bistorta*, *Salix*, *Heracleum*, *Epilobium angustifolium*, *Acer pseudoplatanus*), sometimes linked with honeydew. In Styria a variety of mountain honey is found with the following pollen association: *Calluna*, *Trifolium repens*, *Rubus*, *Rhododendron*, Cruciferae, *Filipendula*, *Acer*, *Hypericum* and a significant proportion of honeydew.

LITERATUR

- ALTE D' MARTINS J. A., 1951. Analise polinica de algumas amostras de mel. *Public. Instituto de Botanica «Dr. Gonçalo Sampaio»*, 2a Série, no. 7, 1-178.
- BOER H. W. DE, 1933. Het verband tusschen de chemische samenstelling en de herkomst van in Nederland gewonnen honig. *Chemisch Weekblad*, **30**, 401-408.
- BOETIUS J., 1948. Ueber den Verlauf der Nektarabsonderung einiger Blütenpflanzen. *Beih. Schweiz. Bienenlg.*, **2**, 257-317.
- DEANS A. S. C., 1939. A pollen analysis of heather honey. *Scottish Beekeeper*, **15**, 38-40.
- DEANS A. S. C., 1957. *Survey of British honey sources*. Bee Research Association, 142, 1-20.
- DEMIANOWICZ Z., 1964. Charakteristik der Einartenhonige. *Ann. Abeille*, **7**, 273-288.
- EVENIUS J., 1932. Eine Untersuchung pommerscher und mecklenburgischer Honige, insbesondere zur Prüfung der Trachtherkunft. *Pommerscher Ratgeber Bienenzüchter*, **32**, 241-246, 268-275.
- EVENIUS J., 1933. Die Prüfung des Sedimentgehaltes norddeutscher Honige im Zusammenhang mit ihren chemisch-biologischen Eigenschaften. *Festschrift zum 60. Geburtstag v. Prof. Zander*, 23-33.
- EVENIUS J., 1958. Pollenanalyse und Begutachtung von sedimentreichen Honigen. *Ann. Abeille*, **1**, 77-88.
- EVENIUS J., 1960. Pollenanalytische Prüfung von Honigen aus der Bundesrepublik. *Dische Bienenwirtschaft*, **11**, 76-80.
- FAEGRI K., 1961. Briefliche Mitteilung.
- FOCKE E., 1966. Briefliche Mitteilung.
- FORSIUS A., 1966. Briefliche Mitteilung.
- FOSSSEL A., 1966. Die Bedeutung der Heidetracht in Österreich. *Bienenwatter*, **87**, 234-238.
- GÉNIER G., 1966. Le pollen des Éricacées dans les miels français. *Ann. Abeille*, **9** (4), 271-321.
- HAMMER O., 1949. Lynghederne og bierne. *Hedelselskabets Tidsskr.*, **70**, 86-89.

- HAMMER O., JÖRGENSEN E. G., MIKKELSEN V. M., 1948. Studier over danske honingprøvers indhold af blomsterstøv. *Tidskr. Planteavl*, **52**, 293-350.
- HEGI G. *Illustrierte Flora von Mitteleuropa*. München 1906-1931, 2. Aufl. 1935-heute.
- LOUVEAUX J., 1966. Essai de caractérisation des miels de Callune (*Calluna vulgaris* SALISB). *Ann. Abeille*, **9** (4), 351-358.
- LOUVEAUX J., VERGERON Ph., 1964. Étude du spectre pollinique de quelques miels espagnols. *Ann. Abeille*, **7**, 329-347.
- LUNDER R., 1945. Pollenanalytiska undersökningar av Svensk honung. *Statens Växtskyddsanstalt Medd.* Nr. 45, 1-31.
- LUNDER R., 1955. Der Einfluss von Honiglösapparaten auf das Pollenbild des Heidehonigs. *Z. Bienenforsch.*, **3**, 49-52.
- MARTIMO E., 1945. Ueber die Zusammensetzung und Herkunft des finnischen Honigs. *Maataloustieteellinen Aikakauskirja*, **17**, 157-169.
- MAURIZIO A., 1943. Pollenundersøgelse foretaget paa danske Honning prøver. *Tidskr. Biavl*, **77**, 159-164.
- MAURIZIO A., 1949. Beiträge zur quantitativen Pollenanalyse des Honigs. *Beih. Schweiz. Bienenztg*, **2**, 320-421.
- MAURIZIO A., 1958. Beiträge zur quantitativen Pollenanalyse des Honigs 3. Absoluter Gehalt pflanzlicher Bestandteile in Esparsette-, Luzerne-, Orangen- und Rapshonigen. *Ann. Abeille*, **1**, 93-106.
- MAURIZIO A., 1964. Mikroskopische und papierchromatographische Untersuchungen an Honig von Hummeln, Meliponinen und andern, zuckerhaltige Säfte sammelnden Insekten. *Z. Bienenforsch.*, **7**, 98-110.
- PRITSCH G., 1958. Untersuchungen über die Bienenweideverhältnisse verschiedener Standorte auf leichteren Böden unter besonderer Berücksichtigung der Untersuchung mittels Honig-Pollenanalyse. *Arch. Geflügelzucht Kleintierkde*, **7**, 184-310.
- SERWATKA J., 1958. Ergebnisse der Pollenanalyse der Heidehonige. *Pszczeln. Zesz. Nauk.*, **2**, 55-66. (polnisch, deutsche Zusammenfassung).
- VIEITEZ E., 1950. Palynological observations on some spanish honeys. *Bull. Torrey Botanical Club*, **77**, 495-502.
- VIEITEZ E., 1951. El polen de las mieles de Galicia. *Anales de Edafologia y Fisiologia vegetal*, **10**, 79-100.
- WOLTHERS P., 1955. Studier over indholdet af blomsterstøv i honningprøver fra danske lyngrækssegne. *Tidskr. Planteavl*, **58**, 683-721.
- WOLTHERS P., 1956. Pollenanalyse af danske lynghonninger. *Tidskr. Biavl*, **90**, 77-78, 95-97.
- ZANDER E., 1932. Untersuchungen über die geformten Bestandteile des Honigs. *Z. Lebensmittel-Unters.*, **63**, 313-329.
- ZANDER E., 1936. Beiträge zur Herkunftsbestimmung bei Honig. *Deutscher Imkerführer*, **10**, 413-422.
- ZANDER E., 1935, 1937, 1941. Beiträge zur Herkunftsbestimmung bei Honig. *Pollengestaltung und Herkunftsbestimmung bei Blütenhonig*. Bd. 1 Berlin Bd. 11, 111 Leipzig.